Anestesia geral de emergência em paciente com fibrose cística

Tarcísio Bossi Cândido¹

Renato Piantino²

Dra. Francielle Marques Araujo Andrade Cançado³

¹ Médico Residente da Santa Casa de Misericórdia de Passos

² Médico da Santa Casa de Misericórdia de Passos

³ Professora da Faculdade Atenas de Passos

Endereço para contato: franciellemac2@gmail.com

Artigo Original

Resumo

A fibrose cística (FC) é uma doença que acomete todo o organismo, principalmente o pulmão, sendo autolimitante e ameaçadora à vida. Com a evolução da medicina, mais de 80% dos pacientes atingem a idade adulta e podem eventualmente necessitar de procedimentos cirúrgico-anestésico. Não existem muitos estudos a respeito do manejo desses pacientes em cirurgias de emergência que requerem anestesia geral. Este artigo relata o caso de uma paciente com FC, submetida à anestesia geral em uma cirurgia de urgência e foi aprovado pelo CEP da Santa Casa de Misericórdia de Passos.

Abstract

Cystic fibrosis (CF) is a disease that affects the whole organism, especially the lung, being self-limiting and life-threatening. With the evolution of medicine, more than 80% of patients reach adulthood and may eventually require surgical-anesthetic procedures. There are not many studies regarding the management of these patients in emergency surgeries that require general anesthesia. This article reports the case of a patient with CF who underwent general anesthesia in an emergency surgery and was approved by the Santa Casa de Misericórdia de Passos.

Introdução

A fibrose cística (FC) foi descrita na década de 1930 por Dorothy Anderson, sendo chamada inicialmente de “fibrose cística pancreática”^{1,2}. Posteriormente descobriu-se que ela é uma doença primariamente pulmonar, que acomete também o sistema gastrointestinal, endócrino e as vias aéreas. Acomete em sua maior parte a população caucasiana em todo o mundo, sendo extremamente autolimitante e ameaçadora à vida^{1,2,3,4}. Possui caráter autossômico recessivo, não ligada ao sexo, com padrão Mendeliano, onde em homozigose, o paciente expressa a patologia e, em heterozigose é considerado apenas como portador assintomático^{2,4}. A mutação genética que causa a FC foi localizada em um locus específico do braço longo do cromossomo 7, que por sua vez, codifica uma proteína de membrana defeituosa, alterando o transporte transmembrana de íons de sódio e cloro, e também de água. Conseqüentemente, acaba gerando alterações no potencial transluminal e

espessamento de secreções^{1,3,4}. Essa proteína, conhecida como Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator (CFTR, regulador da condutância transmembrana na fibrose cística), está presente na porção apical da superfície das células epiteliais, recobrando a maior parte das glândulas exócrinas do organismo^{1,2}.

As mutações do gene CFTR podem ser agrupadas em seis classes distintas: 1) ausência de síntese; 2) maturação proteica defeituosa e degradação prematura; 3) mutações que interferem com a fosforilação e regulação do CFTR; 4) condutância ao cloro defeituosa ou abertura do canal alterada; 5) números reduzidos de transcritores CFTR; 6) turnover acelerado e precoce. A mutação mais comum é de classe dois, a deleção de um aminoácido (fenilalanina) na posição delta F508 da cadeia de proteína, presente em mais de 70% dos casos^{3,4}.

A doença pode acometer vários órgãos tais como glândulas sudoríparas (níveis altos e anormais de cloro e sódio); sistema

cardiovascular (cor pulmonale, baqueteamento digital); pulmões (secreções mucóides espessas, clearance ciliar reduzido, infecções respiratórias recorrentes, bronquiectasia, hemoptíase, destruição do tecido pulmonar pela reação imunológica, hiperreatividade das vias aéreas, hiperinsulflação pulmonar); fígado e vesícula biliar (cirrose, hipertensão portal, colelitíase); trato gastrointestinal (íleo meconial, prolapso retal, obstrução intestinal); vias aéreas superiores (pólipo nasal, obstrução nasal, sinusite); pâncreas (obstrução dos ductos pancreáticos, pancreatite, má absorção de nutrientes, deficiência de vitaminas lipossolúveis, intolerância a glicose); epidídimo (obstrução do fluxo espermático); cérvix (viscosidade cervical anormal)^{1,2,3,4}. Inicialmente, 80% das crianças afetadas morriam nos primeiros anos de vida^{2,3,4}. Com a evolução da medicina e reconhecimento do mecanismo fisiopatológico, mais de 80% dos pacientes atingem a idade adulta e acabam, desta forma, passando inevitavelmente por procedimentos cirúrgico-anestésico ao longo de suas vidas^{3,4,5}. Estudos históricos que avaliaram o risco de se realizar anestesia geral (AG) em pacientes com FC relataram alto risco de morbidade^{3,5}. Hoje, graças aos avanços na área da anestesia moderna, foi observado que, nas últimas décadas, houve um decréscimo importante na taxa de complicação pós-anestésicas, melhorando muito a segurança e eficiência deste procedimento^{2,4,5}. O manejo anestésico de pacientes com FC em cirurgias eletivas já possui um protocolo bem estabelecido, melhorando assim o desfecho cirúrgico para essa população, mas, em contrapartida, não existem muitos estudos a respeito do manejo desses pacientes em cirurgias de emergência que requerem anestesia geral.^{1,2,3,4}

Relato de Caso

Paciente 42 anos, sexo feminino, 45kg, portadora de FC, em uso diário de Alênia, ASA PS2E. Término recente (há dois dias) de tratamento para pneumonia por *Pseudomonas aeruginosa*, com uso de Levofloxacino 500mg. Apresentou quadro clínico, laboratorial

e radiológico sugestivo de apendicite e massa anexial inconclusiva à ultrassonografia (US). Realizado videolaparoscopia diagnóstico-propedêutica. Procedimento sob AG, utilizando-se, Lidocaina 2% 45mg, Fentanil 150mcg, Propofol 100mg, Rocurônio 50mg, sem intercorrências, e manutenção com Sevoflurane. Administrou-se também Dexametasona 10mg, Hidrocortisona 1g e Cetoprofeno 100mg. Apresentou pressão de pico pulmonar de 24 cmH₂O inicialmente, mantendo em 28 cmH₂O durante a cirurgia. Manteve-se hemodinamicamente estável, sem alterações nos parâmetros respiratórios no transoperatório. Durante e ao final da cirurgia, foram realizadas aspirações do tubo orotraqueal com quantidade moderada de secreção amarelada clara, de consistência fina, sem aspecto infeccioso. Após 45min do término do procedimento a fração expiratória do Sevoflurane encontrava-se em valor aceitável para a passagem do modo respiratório para espontâneo. Foi verificado que a paciente não possuía um drive respiratório satisfatório, apresentando uma frequência respiratória de 40irpm, com volume corrente de 73 mL e movimentos diafragmáticos involuntários semelhante a eructação. Após 10 min de observação, apesar de apresentar reflexo de deglutição preservado, não apresentou resposta motora satisfatória e iniciou-se padrão de dessaturação. Optou-se por encaminhar a paciente intubada à UTI, para observação, até melhora do padrão respiratório a níveis próximos do pré-operatório. Após cinco horas a paciente foi extubada sem intercorrências, apresentando normalização dos parâmetros respiratórios.

Discussão

Anestesiando pacientes com doenças de base que acometem os pulmões é sempre um desafio e o objetivo geral é tentar minimizar os impactos que os anestésicos podem causar à função e/ou dinâmica pulmonar^{2,3,4}. Existe, no entanto, uma discussão a respeito da utilização de bloqueio e analgesia locais e neuroaxiais somados ou não à AG^{3,4}. Além disso, discute-se também a utilização da AG

mista isoladamente e anestesia venosa total^{1,2,3,4}. Cada procedimento anestésico possui seus riscos e benefícios inerentes, sendo todos eles justificáveis, ou seja, é prudente que se avalie cada caso separadamente^{3,4}.

O benefício em se realizar bloqueios locais e analgesias neuroaxiais nestes pacientes, se deve ao fato de não alterarem diretamente o padrão respiratório e a capacidade de se controlar muito bem a dor pós-operatória, facilitando a fisioterapia pulmonar e a ventilação^{1,3,4}. Mas, dependendo da altura do bloqueio, podem inevitavelmente causar um relaxamento indesejável na musculatura, prejudicando o padrão respiratório, o que pode ser deletério ao paciente⁵. A realização da AG tem como maior benefício a broncodilatação e redução da hiper-reatividade das vias aéreas, que é proporcionada pelo gás halogenado^{1,2,3,4}. Em contrapartida, questiona-se a depressão respiratória que pode ser causada pelo uso de anestésicos venosos, como opioides e o prejuízo, mesmo que momentâneo, à função pulmonar^{1,2,3,4}. A anestesia venosa total é também uma alternativa válida para estes casos, apesar da perda do benefício da broncodilatação, mas infelizmente não se dispunha na unidade do Remifentanil, uma das drogas essenciais para o sucesso desta abordagem^{2,4}.

A paciente do caso apresenta a forma mais comum de mutação do gene de FC, citada anteriormente, com acometimento primariamente pulmonar, comprometimento pancreático, sem alterações hepáticas aparente⁴. Como a maior parte dos pacientes, ela apresenta decréscimo gradativo da função pulmonar, acometimento nutricional importante, crises repetidas de infecção pulmonar por *Pseudomonas aeruginosa*, e internações hospitalares esporádicas para controle de infecções mais resistentes^{1,2,3,4}.

A escolha da AG para o procedimento se deve ao fato do cirurgião ter optado a realizar o procedimento cirúrgico por videolaparoscopia, além da paciente ter optado a não passar novamente por um bloqueio ou analgesia de neuroeixo, visto que teve experiência traumática com raquianestesia

anterior (cefaleia pós punção), contraindicando assim a mesma.

A despeito da técnica anestésica utilizada, o padrão respiratório da paciente voltou aos níveis pré-cirúrgicos observados, sem prejuízo ou dano permanente ao parênquima pulmonar.⁵ Não se sabe ainda o real motivo da não resposta verbal observada ao final do procedimento, apesar do reflexo motor preservado. Como não havia exames prévios que mostrassem a relação de albumina/globulina, pode ser que esses níveis estivessem baixos, fazendo com que o efeito do opioides perdurasse por um tempo maior do que o esperado.³ A queda transitória e abrupta da função pulmonar, pode ter ocorrido devido ao efeito deletério dos anestésicos utilizados, somados à fragilidade pulmonar existente causada pelo quadro recentemente tratado de pneumonia^{1,3,4,5}.

Conclusão

Como não existem muitos estudos na condução de pacientes com FC em situação emergencial, recomenda-se que, independentemente do grau de evolução da doença ou técnica anestésica utilizada, todos os pacientes com esta patologia, que estejam ou não com exacerbação ativa ou em estado grave, sejam enviados à UTI no pós-cirúrgico imediato, para acompanhamento da função pulmonar e padrão respiratório.

Referencias bibliográficas

- 1 Karlet MC. An update on cystic fibrosis and implications for anesthesia. *AANA Journal* 2000;68(2):141-150.
- 2 Fitzgerald M, Ryan D. Cystic fibrosis and anaesthesia. *Continuing Education in Anaesthesia, Critical Care & Pain* 2011; 1(6):204-209.
- 3 Walsh TS, Young CH. Anaesthesia and cystic fibrosis. *Anaesthesia* 1995; 50:614-622.
- 4 Huffmyer JL, Littlewood KE, Nemergut EC. Perioperative Management of the Adult with Cystic Fibrosis. *ANESTHESIA & ANALGESIA* 2009;109(6):1949-1961.
- 5 Pandit C et al. Effect of general anesthesia on pulmonary function and clinical status on children with cystic fibrosis. *Paediatr Anaesth* 2014; 24(2):164-169.